

MA2 - "překusná" přednáška 20.5. 2020

Minule přednáška byla věnována základním poznatkům o nekonečných číselných řadách. Definovali jsme pojmy - řada konvergentní, divergentní, absolutně konvergentní řada, a probrali jsme několik základních kritérií konvergence číselných řad.

A mezi příklady typičtější konvergence řad byly řady

$$\sum_0^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \sum_1^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad \sum_1^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2},$$

kde členy řad jsou funkce (zde definované v \mathbb{R}). A také už v Matematice A1, v souvislosti s Taylorovými polynomy funkce (důležitými aplikacemi derivací funkce), jsme si uvedli t.zv. Taylorovy řady (což byly limity Taylorova polynomu stupně n pro $n \rightarrow \infty$): pro $x \in \mathbb{R}$ je

$$e^x = \sum_0^{\infty} \frac{x^n}{n!}; \quad \sin x = \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}; \quad \cos x = \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

Řady $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, kde členy řady jsou funkce $f_n(x)$, se nazývají

funkční řady (nebo řady funkcí), a množina bodů $x \in \mathbb{R}$, kde

řada $\sum_1^{\infty} f_n(x)$ konverguje (jako řada čísel), se nazývá

obor konvergence této řady.

Kromě řady $\sum_1^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$, která "patří" mezi t.zv. řady trigonometrické, jsou uvedené řady t.zv. řady

mocninové (jako by nekonečné polynomy), obecně mocninová

řada je tvaru $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$, $a_n \in \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$.

Obory konvergence uvedených řád funkcí:

řády $\sum_0^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $\sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $\sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ mají

obor konvergence celé \mathbb{R} (první z nich jsme vyšetřili jako cvičení na absolutní konvergenci číselných řád);

řáda $\sum_1^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ konverguje v $(-1, 1)$;

obor konvergence řády $\sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ je interval $(-1, 1)$;

obor konvergence řády $\sum_1^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ je opět \mathbb{R} .

Funkční řády jsou velmi užitečné i v aplikacích reálného světa, pokud $f(x) = \sum_1^{\infty} f_n(x)$ v oboru konvergence, lze pomocí číselných součtů řády aproximovat množstvem funkcí; když nepřiblížíme, že $e^x = \sum_0^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, máme nové "vyjádření" základní elementární funkce e^x , a tohoto vyjádření pomocí nerovinné, spec. Taylorovy řády, lze využít mnoha způsoby, k aproximaci hodnot, i k důležitým vlastnostem exponenciály.

Konvergenci nekonečných řád funkcí, tj. nalezení oboru konvergence funkční řády, lze uplatnit pomocí výsledků teorie řád číselných (takové proto učíme), ale u funkčních řádů se objevují jiné důležité problémy - souvislost mezi vlastnostmi členů řády $\sum_1^{\infty} f_n(x)$, tj. vlastnostmi funkcí $f_n(x)$, $n=1, 2, \dots$ a vlastnostmi součtu řády.

Problémy u nekonečných řad funkce jsou například tyto
(a jejich řešení je dost důležité v ústí funkčních řad):

jsou-li $f_n(x)$ funkce spojitě v (a,b) , $n=1,2,\dots$, a $\sum_1^{\infty} f_n(x)$ v (a,b)
konverguje, zda součet řady je $f(x) = \sum_1^{\infty} f_n(x)$ je také
v (a,b) spojitá - tedy je zde otázka, za jakých podmínek
spojitých funkcí, tj. limita posloupnosti $\{S_N(x)\}_{N=1}^{\infty}$, kde
 $S_N(x) = \sum_1^N f_n(x)$, je funkce spojitá, a podobně otázky -

- zda nekonečný součet, tj. řada funkce, majících derivaci,
má také derivaci (a navíc, zda a kdy platí, že derivace řady
je řada derivací - tj. kdy platí "zobecněná" pravidla o derivování
součtu nekonečně mnoha funkcí, a tyto otázky

se položit i v souvislosti s existencí a výpočtem primitivní
funkce i určitého integrálu. A ukazuje se, že ne vždy má
řada (tj. součet nekonečně mnoha funkcí) stejné vlastnosti,
jako mají členy tvořící funkční řady. A v teorii
funkčních řad se pak formulují podmínky, za kterých se
vlastnosti $\{f_n(x)\}_1^{\infty}$ přenášejí i na $f(x) = \sum_1^{\infty} f_n(x)$.

A toto není jednoduché (až na výjimky), protože v této
teorii řada nových důležitých pojmů, týkajících se konvergence,
ale to přesahuje naši Matematika A2 (někdy probíráme
ne "Vybraných partiích z matematiky").

Ukažme si jednoduchý příklad:

Uvažujme posloupnost $\{g_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$, $g_n(x) = x^n$, $x \in \langle 0, 1 \rangle$.

Pak, pro $x \in \langle 0, 1 \rangle$ je $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$, ale

pro $x = 1$ je $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$,

tedy limita „jednoduché“ posloupnosti funkcí, spojitých na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ je funkce nespojitá v $\langle 0, 1 \rangle$, limita není spojitá v bodě 1 zleva, na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ limita není spojitá je.

A proč je fce $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ nespojitá v bodě 1 zleva, a tedy bude limita posloupnosti spojitých funkcí na MCR spojitá na M? Takový problém a problémy je v teorii funkčních řad hodně, my zde uvedeme vlastnosti mocninových řad, které mají vlastnosti „dobré“:

Věta (o obvodu konvergence)

Mějme mocninovou řadu $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $a_n \in \mathbb{R}$ pro $n=1, 2, \dots$.

Pak tato řada konverguje jím v bodě $x = x_0$, nebo konverguje pro všechna $x \in \mathbb{R}$, nebo existuje číslo $\varepsilon > 0$ tak, ať řada konverguje absolutně v intervalu $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ a diverguje pro $|x - x_0| > \varepsilon$, tj. pro $x \in (-\infty, x_0 - \varepsilon) \cup (x_0 + \varepsilon, +\infty)$.

Číslo $\varepsilon > 0$ se nazývá poloměr konvergence řady $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$.

A v našich „příkladech“:

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ($x_0=0$) konverguje v \mathbb{R} (někdy se říká, ať $\varepsilon = \infty$);

$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ konverguje jím v bodě $x_0=0$ (zde, u mocninových řad, znamena $0^0 = 1$);
(někdy $\varepsilon=0$)

$\sum_1^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ konverguje v intervalu $(-1, 1)$, tedy $\kappa=1$;

$\sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ konverguje v intervalu $(-1, 1)$, tedy opět, $\kappa=1$.

A vidíme (příkladka k větě), že v bodech x , pro které je $|x-x_0| = \kappa$, tj. pro $x = x_0 + \kappa$ a $x = x_0 - \kappa$, může mít „mezička“, řada může v těchto bodech konvergovat, nebo divergovat.

A vlastnosti mocninových řad jsou shrnuty v následující větě:

Věta (vlastnosti mocninových řad)

Necht' mocninová řada $\sum_0^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ má poloměr konvergence $\kappa > 0$ nebo $\kappa = +\infty$. Pak platí (označme $\sum_0^{\infty} a_n(x-x_0)^n = f(x)$ v oboru konvergence):

- 1) $f(x)$ je funkce spojitá v oboru konvergence;
- 2) v intervalu $(x_0 - \kappa, x_0 + \kappa)$ má funkce f derivace všech řádů a platí $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-x_0)^{n-1}$;

řada „derivací“ $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-x_0)^{n-1}$ má stejný poloměr konvergence jako řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$;

(Připomeňme, že mocninovou řadu můžeme derivovat „člen po členu“ pravidlo o derivaci součtu lze pro mocninové řady „kročit“ i na nekonečné součty - tj. $\left(\sum_0^{\infty} a_n(x-x_0)^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n(x-x_0)^n)'$)

3) řada $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-x_0)^{n+1}$ má stejný poloměr konvergence jako řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ a platí (integrace „člen po členu“)

$$\int \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-x_0)^{n+1} + C,$$

a také pro určitý integrál platí (součet je funkce spojitá v oboru konvergence): je-li $\langle a, b \rangle \subset (x_0 - R, x_0 + R)$, pak

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} [x^{n+1}]_a^b;$$

4) je-li $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n$ v okolí $U(x_0)$,

pak $a_n = b_n$ pro všechna $n=1, 2, \dots$ (analógie vlastnosti polynomů)

A ztřeď „jedna jedná“ vlastnost mocninových řad:

Věta: je-li $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ v okolí $U(x_0, \delta)$, pak

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \text{ tedy, rovninná řada je Taylorova}$$

řadou funkce f (o středě $x_0 \in \mathbb{R}$)

Překážce, že rovninná řada je v tomto případě, tj. když $k > 0$ nebo $k = +\infty$, Taylorovou řadou svého součtu.

Ukažme si dále několik příkladů naší rovninných řad a jak je lze někdy sečíst.

Příklad 1

V minulé přednášce bylo prokázáno, že $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \ln(x+1)$
v intervalu $(-1, 1)$, a odtud pro $x=1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$.

Konvergenci řady jsme v přednášce uměle "mysleli", ukážeme si,
jak se dá uměřovaná řada "sečíš" :

1) vezmeme derivaci : $(\ln(x+1))' = \frac{1}{1+x}$ v $(-1, +\infty)$

2) $\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n$ - součet geometrické řady
s kvocientem $q = -x$,
řada konverguje pro $x \in (-1, 1)$

3) neomezenou řadu (dle učeb.) lze v $(-1, 1)$ integrovat "člen po členu",

tj. $\int \frac{1}{1+x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + C_1$ a také

$$\int \frac{1}{1+x} dx = \ln(x+1) + C_2 \quad v \quad (-1, 1)$$

tedy, $\ln(x+1) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ v $(-1, 1)$

a zvolíme-li $x=0$, pak $\ln 1 = C = 0$, tj. (někdy $n+1$ píšeme
 $n, n=1, 2, \dots$)

$$\ln(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad v \quad (-1, 1) \quad (*)$$

4) dle vlastností neomezených řad (1) nevěte) je součet řady
funkce spojitá v $(-1, 1)$ (tj. v oboru konvergence), a proto
je spojitá i funkce $\ln(x+1)$ v bodě $x=1$, platí rovnost (*) i
v bodě $x=1$, tj. $\ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

Příklad 1

Podobně, jako v příkladu 1, lze ukázat, že platí

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{v } \langle -1, 1 \rangle !$$

1) $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{v } \mathbb{R}$

2) $\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_0^{\infty} (-x^2)^n = \sum_0^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{v } (-1, 1)$

(geometrická řada s kvocientem $q = -x^2$, konverguje v $(-1, 1)$)

3) řadu v 2) lze v $(-1, 1)$ integrovat „člen po členu“, tedy

$$\operatorname{arctg} x = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \sum_0^{\infty} (-1)^n \int x^{2n} dx = \sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + C$$

pro $x \in (-1, 1)$

a nalezneme konstantu C zvolíme

$C=0$: $\operatorname{arctg} 0 = 0 = 0 + C \rightarrow C=0$,

tedy v $(-1, 1)$ je $\operatorname{arctg} x = \sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

4) a opět, díky ujištění součtu řady $\sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ v oboru konvergence, tj. v intervalu $\langle -1, 1 \rangle$ (a ujištění že $\operatorname{arctg} x$)

platí:

$$\operatorname{arctg} x = \sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{v } \langle -1, 1 \rangle$$

5) a pro $x=1$: $\frac{\pi}{4} = \sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$, tj.
(dostaneme)

$$\pi = 4 \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

A rovnice každé lze užit pro vyjádření primitivních funkcí, které nese vyjádřit pomocí elementárních funkcí (např. primitivní funkce je $f(x) = e^{-x^2}$, nebo $f(x) = \frac{\sin x}{x}$), i le vyjádření určitých integrálů:

Příklad 3 - primitivní funkce le funkce $f(x) = e^{-x^2}$ v \mathbb{R}

$$\text{v } \mathbb{R} \text{ je } e^{-x^2} = \sum_0^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n}, \text{ tedy}$$

v \mathbb{R} lze (dle metody, část 3) vyjádřit primitivní funkce:

$$\begin{aligned} \int e^{-x^2} dx &= \int \left(\sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n} \right) dx = \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int x^{2n} dx = \\ &= \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + C \quad (\text{opět integraci člen po členu}) \end{aligned}$$

Příklad 4 - primitivní funkce le $f(x) = \begin{cases} 1, & x=0 \\ \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \end{cases}$ v \mathbb{R} :

$$f(x) = \sum_0^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k+1)!} \text{ konverguje v } \mathbb{R}, \text{ tedy (je to opět}$$

každá rovnice) lze integrovat „člen po členu“ jako rovnici každé v \mathbb{R} , a pak

$$\int f(x) dx = \int \left(\sum_0^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k+1)!} \right) dx = \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!(2k+1)} x^{2k+1} + C,$$

$x \in \mathbb{R}$

Příklad 5 A protože máme primitivní funkci k $f(x)$ z příkladu 4 v \mathbb{R} , můžeme tak vyjádřit

$$\int_0^1 \frac{e^{ix}}{x} dx = \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!(2k+1)} [x^{2k+1}]_0^1 = \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k+1)!(2k+1)} =$$

$$= 1 - \frac{1}{3 \cdot 3!} + \frac{1}{5 \cdot 5!} - \frac{1}{7 \cdot 7!} + \dots$$

A ještě několik poznámek:

- 1) Pokud bychom používali rovnost $\ln 2 = \sum_1^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ k výpočtu hodnoty $\ln 2$ tak, ať použijeme jako opevnovací číselný součet nekonečné řady, pak lze u alternujících řad i odhadnout, jak velkou "chybu" uděláme:

Věta: Je-li dána řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$, $a_n \geq 0$, $n=1, 2, \dots$

je a_n je klesající posloupnost a $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, pak, omezeně-li

$$R_k = \sum_{n=k+1}^{\infty} (-1)^n a_n, \text{ je } |R_k| \leq a_{k+1}.$$

- 2) V matematice A1 jsme si odvodili, že platí

$$e^x = \sum_0^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \text{ a zde jsme ještě ukázali i první}$$

kritérií konvergence, že řada konverguje v \mathbb{R} ;

ukázali jsme to pomocí Taylorova vzorce:

$$e^x = \sum_0^N \frac{x^n}{n!} + R_N(x), \text{ kde } R_N(x) \rightarrow 0 \text{ pro } N \rightarrow \infty$$

(a lib. $x \in \mathbb{R}$)

A pravei vyjadreni' exponenciely nerovinnou (Taylorovu) radou
v \mathbb{R} se rozsi' exponentiala i do komplexneho oboru - do \mathbb{C} :

pre $z \in \mathbb{C}$ definujeme $e^z = \sum_0^{\infty} \frac{z^n}{n!}$, tato rada konverguje

pre vsadnu $z \in \mathbb{C}$ (lepa' vhodne' rozsi'ujeme podm konvergence rady
i na rady c'isel komplexnych). A specialne', ke-li $z = ix, x \in \mathbb{R}$,

dotaneme nam (z diferencialnych rovnici) znamy' vztah:

$$\underline{e^{ix} = \cos x + i \sin x, x \in \mathbb{R} :}$$

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}, \text{ tj.}$$

$$\underline{e^{ix} = \cos x + i \sin x, x \in \mathbb{R}}$$

A uplni' poslednu' poznamku (v matematice A2)

Mezi priklady, ktere' jsme si uvedli, byla i rada $\sum_1^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$,
konvergentni' v \mathbb{R} , ktera' „jaku'“ ma i l.z.v. Trigonometricke'
rady, jejichz' obecn' tvar je $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$.

Vys'etovame' konvergence a vlastnosti' trigonometrickych' rad
je dost obtiznejsi' nez' u' tech' „pe'vne' vlastnosti'“ maji'ci'ch
rad nerovinnych'. Trigonometricke' funkce slouzi' k vyjadreni'
2 π -periodickych' funkci' (v nasem' tvaru, ale jemu i trasy rad
pre obecnou periodu), ale soucit' trigonometricke' rady
u' nem' obecn' funkce spjata', nebo katera', a' ma' vsude
derivace, i ledy' c'leny rady jsou nekonecne' derivovatelne'.

Mesi trigonometrické řady palů i speciální řady,
t. j. řady Fourierovy, které lze definovat pro
funkce f , 2π -periodické a $f \in R(-\pi, \pi)$ (tedy
pro funkce Riemannovsky integrovatelné v $(-\pi, \pi)$, a kde

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx, \quad b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx, \quad m=0, 1, 2, \dots$$

(a_m, b_m se nazývají Fourierovy koeficienty pro f).

Fourierovy řady jsou velmi užitečným nástrojem pro
upřesňování periodických dějů v aplikacích, je jim věnováno
hodně literatury. Trochu je třeba probírat ve „Vybraných
partičkách“, zejména v druhé části zimního semestru.

Důležitý výsledek pro Fourierovy řady (pro „naš“) by mohl být:

Pokud f je 2π -periodická funkce (def. v \mathbb{R}), spojitá, a po částech
hladká (tj. v intervalu $(-\pi, \pi)$ existují jen konečně mnoho
bodů, kde funkce f nemá derivaci, ale v těchto bodech má
 f' jednostranné liché konečné (tedy ve „špičkách“ není snůla
lečna), pak její Fourierova řada konverguje v \mathbb{R} a platí

$$\underline{f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_1^{\infty} (a_m \cos mx + b_m \sin mx)} \quad | x \in \mathbb{R}$$

Dále je známo, že pro $f \in R(-\pi, \pi)$ platí:

jsou-li a_m, b_m Fourierovy koeficienty pro f , pak

$$\sum_1^{\infty} (a_m^2 + b_m^2) \text{ konverguje.}$$

Pro rozmanost, uvedme si několik příkladů Fourierových řad:

1) $f(x)$ je 2π -periodická funkce, $f(x) = |x|$ pro $x \in \langle -\pi, \pi \rangle$:

f je spojitá, po částech hladká, a platí:

$$\text{pro } x \in \langle -\pi, \pi \rangle \text{ je } |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\cos(2m+1)x}{(2m+1)^2},$$

a odtud, vhodnou volbou x , se získá:
$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

2) $f(x)$ je 2π -periodická funkce, $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \langle -\pi, 0 \rangle \\ \sin x, & x \in \langle 0, \pi \rangle \end{cases}$

opět, f je spojitá funkce v \mathbb{R} , po částech hladká, a platí

$$f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{(2k-1)(2k+1)}, \quad x \in \langle -\pi, \pi \rangle$$

3) $f(x)$ je 2π -periodická funkce, $f(x) = x$ pro $x \in \langle 0, 2\pi \rangle$

f má není spojitá v \mathbb{R} , není spojitá v bodech $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$;

a pak je
$$f(x) = \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in (0, 2\pi)$$

a součet Fourierovy řady v bodech $2k\pi$ je $\phi(2k\pi) = \pi$,

což je
$$\frac{\lim_{x \rightarrow 2\pi^-} f(x) + f(2\pi)}{2}.$$

(Zase je známý - důležitý! důsledek v teorii Fourierových řad)